3 2044 107 267 643

Taxf
P69



Digitized by the Internet Archive
in 2014

https://archive.org/details/plantarumindigen4179unse

PLANTARUM
indigenarum et exoticarum
ICONES
ad vivum coloratae.

Oder:

Sammlung
nach der Natur gemalter
Abbildungen
inn- und ausländischer Pflanzen,
für Liebhaber und Beflissene der Botanik.

Herausgegeben
von
einer Gesellschaft Kräuterkenner.

Vierter Jahrgang.

Wien und Leipzig,
bey Lukas Hochenleitter und Kompagnie.

MDCCXCI.

ARNOLD ARBORETUM

32026

July 30, 1919

Alphabetisches Verzeichniß

der

Abbildungen

inn- und ausländischer Pflanzen,

so in den 6 Heften

des

vierten Jahrganges

enthalten sind.

A.

Achrostichum septentrionale. **Mitternächtlicher vollblühender Farrn.** 24 Klasse.

Mit nackten gleichbreiten zerschlissenen Blättern. Wächst in Schweden, Deutschland, Frankreich und in der Schweiz in den Ritzen der Felsen.

Aira minuta. **Kleine Schmiele.** 3 Klasse.

Mit einer losen fast spitzstraußartigen überaus ästigen Rispe, und unbewehrten Blümchen. In Spanien und Thracien.

Alopecurus agrestis. **Ackerfuchsschwanz.** 3 Klasse.

Mit einem ährentragenden aufrechtstehenden Halme und nackten Bälglein. In den südlichen Provinzen Deutschlands.

Anemone alpina. **Alpen-Anemone.** 13 Klasse.

Mit 3 zusammengewachsenen, dreyfach gefiederten, aus vielspaltigen Blättchen bestehenden Stengelblättern, und zottigen geschwänzten Saamen. Auf den schweitzerischen und steyermärkischen Alpen.

Aretia alpina. **Alpen-Aretie.** 5 Klasse.

Mit gleichbreiten abstehenden Blättern, und gestielten Blumen. Auf den schweitzerischen Alpen.

Asclepias incarnata. **Fleischrothe Aeskulapie.** 5 Klasse.

Mit lanzenförmigen Blättern, einem oben zertheilten Stengel und doppelten aufrechtstehenden Blumendolden. In Virginien und Canada.

Asparagus officinalis. **Gewöhnlicher Spargel.** 6 Klasse.

Mit einem krautartigen, runden, aufrechten Stengel; borstenförmigen Blättern, und paarweise stehenden Blattansätzen. In dem südlichen Europa, auch in Schweden und Sibirien.

Asphodelus luteus. **Gelbe Affodile.** 6 Klasse.

Mit einem blätterigten Stengel und dreyseitigen gestreiften Blättern. In Sicilien und in der Schweiz.

Asplenium Ruta muraria. **Mauerraute.** 24 Klasse.

Mit wechselweise doppelt zusammengesetzten Blättern, und keilförmigen feingekerbten Blättchen. In Europa.

Asplenium Scolopendrum. **Hirschzunge.** 24 Klasse.

Mit einfachen Herz-Zungenförmigen glattrandigen Blättern und zottigen Stielen. In Europa.

Atropa Belladonna. **Gemeine Wolfskirsche.** 5 Klasse.

Mit einem krautartigen Stengel und eyrunden glattrandigen Blättern. In Italien, Frankreich, Deutschland, England, Holland und in der Schweiz.

Avena flavescens. **Goldhafer.** 3 Klasse.

Mit einer losen Rispe, dreyblumigen kurzen Kelchen, und lauter mit Grannen bewehrten Blümchen. In einigen Ländern von Europa und Asien.

Azalea nudiflora. **Nacktblümiger Felsenstrauch.** 5 Klasse.

Mit eyrunden Blättern, haarigen Blumenkronen und sehr langen Staubfäden. In Nordamerika.

B.

Blitum capitatum. **Kopfförmige Beermelde.** 1 Klasse.

Mit ährenförmig zusammengesetzten Blumenköpfchen an den Enden der Zweige. In Europa, besonders in Tyrol.

Bromus mollis. **Weicher Tresp.** 3 Klasse.

Mit einer zimlich aufrechten Rispe, eyrunden zarthaarigen Aehren, geraden Grannen und überaus weichen zottichen Blättern. In Europa.

Bryum hypnoides. **Astmoosähnliches Knotenmoos.** 24 Klasse.

Mit aufrechtstehenden Staubbeuteln, einem zimlich aufrechten Stamme, und kurzen fruchtbaren seitwärts befestigten Aestchen. Wächst auf Steinen, Felsen und sandichtem Boden auf hohen Gebirgen von Europa.

C.

C.

Cactus repandus. **Ausgeschweifte Fackeldistel.** 12 Klasse.

Wächst aufrecht, lang und achteckig mit zusammengedrückten wellenförmig erhabenen Ecken, und Stacheln, welche an Länge der Wolle übertreffen. In dem wärmeren Amerika.

Cenchrus echinatus. **Jamaisches Stachelgras.** 23 Klasse.

Mit einer länglichten zusammengedrungenen Aehre. In Jamaika und anderen westindischen Inseln.

Cytisus Laburnum. **Bohnenbaum.** 17 Klasse.

Mit einfachen, herabhängenden Blumentrauben, und eyrund-länglichten Blättern. In Oesterreich, Savoyen und in der Schweitz.

D.

Dactylis glomerata. **Knaulförmiges Hundsgras.** 3 Klasse.

Mit einer einseitigen zusammengedrungenen Rispe. In Europa.

Dipsacus laciniatus. **Zerschlissene Karte.** 4 Klasse.

Mit zusammengewachsenen, am Rande ausgehöhlten Blättern. In einigen Gegenden Deutschlands, in der Schweitz, und in Sibirien.

Dracontium pertusum. **Durchstossene Zehrwurz.** 20 Klasse.

Mit durchlöcherten Blättern und einem kletternden Stamme. In Westindien.

Drypis spinosa. **Stachlichte Haberdistel.** 5 Klasse.

Dreyweibig. Der Kelch fünfspaltig, die Blumenkrone fünfblättrig. Die einfächerige Saamenkapsel, welche horizontal voneinander springt, erthält nur 1 Saamen. Sie ist die einzige Art dieses Geschlechts, und wächst in Mauritanien, wie auch an den Seeküsten von Italien und Oesterreich.

E.

Elymus Caput Medusae. **Medusenhaupt.** 3 Klasse.

Mit zweyblüthigen Aehrchen und borstenartigen überaus weit abstehenden Hüllen. In Portugal und an den spanischen Seeküsten.

Elymus sibiricus. **Sibirisches Roggengras.** 3 Klasse.

Mit einer festen hängenden Aehre, und paarweise stehenden Aehrchen, die länger als der Kelch sind. In Sibirien.

Eryngium alpinum. **Alpen-Mannstreu.** 5 Klasse.

Mit rundlichten in zerschlissene fingerförmige Lappen zertheilten Blättern, und einem länglichten Blumenköpfchen, das eine vielblättrichte Hülle, und dreyspaltige Spreuerblättchen hat. Auf den Alpen in Italien, Oesterreich und der Schweitz.

Erythronium Dens canis. **Gemeiner Hundszahn.** 6 Klasse.

Mit einer sechsblätterigen glockenförmigen Blumenkrone, an deren Basis inwendig wechselweise 2 mit einem Honigsafte versehene Höcker angewachsen sind. In dem südlichen Europa, wie auch in Virginien und Sibirien.

Euphorbia epithymoides. **Flachsseidenartige Euphorbie.** 11 Klasse.

Mit einer fünfspaltigen allgemeinen Blumendolde, deren kleinere zweytheilig sind, und eyrunde Hüllen haben, wie auch mit lanzenförmigen stumpfen, auf der untern Seite haarigen Blättern. In Italien.

Euphorbia sylvatica. **Waldeuphorbie.** 11 Klasse.

Mit einer fünfmal gespaltenen allgemeinen Blumendolde, deren kleinere zweymal gespalten sind, und vom Stiele durchstochene fast herzförmige Hüllen haben; und lanzenförmigen glatträndigen Blättern. Im mittägigen Europa.

G.

Geranium hybridum. **Unächter Storchschnabel.** 16 Klasse.

Mit einblätterichten Blumenkelchen; fast scheibenrunden, glatten, gekerbten unzertheilten Blättern und strauchartigem Stengel. Auf dem Vorgebürge der guten Hofnung.

Glorioſa ſuperba. **Stolze Prachtlilie.** 6 Klasse.

Mit gabelnttragenden Blättern. In Ostindien.

H.

Hieracium ſubaudum. **Savoysches Habichtskraut.** 19 Klasse.

Mit einem aufrechtstehenden vielblumigen Stengel, eyrund-lanzenförmigen gezähnten, den Stengel zur Hälfte umfassenden Blättern. In Europa.

Holcus lanatus. **Wolliges Honiggras.** 23 Klasse.

Mit zweyblüthigen weichbehaarten Bälglein, einem unbewehrten Zwitter-Blüthchen, und einem männlichen, welches mit einer rückwärts gekrümmten Granne bewehrt ist. In Europa.

Hordeum Zeocriton. **Bartgerste.** 3 Klasse.

Mit männlichen seitwärts stehenden unbewehrten Blümchen, und eckigen abstehenden in den Spelzen fest eingeschlossenen Saamen. Das eigentliche Vaterland ist unbekannt.

I.

Iſoetes lacuſtris. **See-Brachsenfarrn.** 24 Klasse.

Mit pfriemenförmigen halbrunden rückwärts gekrümmten Blättern. In dem nördlichen Europa auf dem Boden der Seen.

L.

Lagurus ovatus. **Eyförmiges Sammtgras.** 3 Klasse.

Mit einer eyförmigen mit Grannen bewehrten Aehre. In einigen Ländern des mittägigen Europa.

Lava-

Lavatera trimestris. **Syrische Lavatere.** 16 Klasse.

Mit einem rauhen krautartigen Stengel, lanzenförmigen Blättern, einblumigen Blumenstielen und Früchten, welche mit einem Deckel bedeckt sind. In Syrien, Spanien und Languedoc.

Ligusticum austriacum. **Oesterreichischer Liebstöckel.** 5 Klasse.

Mit doppelt gefiederten Blättern, deren eingeschnittene glattrandige Blättchen an ihrer Basis miteinander zusammenhangen. Auf den Alpen in Oesterreich, Ungarn und Italien.

Lonicera Periclymenum. **Gemeine Speckliljie.** 5 Klasse.

Mit eyrunden Blumenköpfchen an den Enden der Zweige, deren Blumen wie Dachziegel übereinander liegen, und lauter voneinander unterschiedenen Blättern. In Europa.

Lonicera tartarica. **Tartarische Lonicere.** 5 Klasse.

Mit zweyblumigen Blumenstielen, unterschiedenen Beeren und ovalen glattrandigen Blättern. In der Tartarey.

Lycopodium inundatum. **Ueberschwemmte Bärlappe.** 24 Klasse.

Mit zerstreutsitzenden glattrandigen Blättern und blättrichen an den Spitzen der Aeste besetzigten Blüthenähren. In überschwemmten Gegenden von Europa.

M.

Milium paradoxum. **Haferartiges Hirsengras.** 3 Klasse.

Mit rispenförmigen mit Grannen bewehrten Blüthen. In Frankreich, Krain und in der Levante.

Mimosa punctata. **Gedüpfelte Sinnpflanze.** 23 Klasse.

Ohne Stacheln; mit doppelt gefiederten Blättern, und aufrechten Blumenähren, deren Blumen 10 Staubfäden haben, die an den untersten ohne Staubbeutel sind. In Westindien und Virginien.

Mnium fontanum. **Quellen-Sternmoos.** 24 Klasse.

Mit einem einfachen Stamme, dessen knotige Gelenke einwärts gebogen sind. In Europa an kalten Quellen.

Mnium pellucidum. **Durchscheinendes Sternmoos.** 24 Klasse.

Mit einem einfachen Stamme und eyrunden Blättern. In Europa.

O.

Cnopordon illyricum. **Illyrische Zellblume.** 19 Klasse.

Mit sparrichten Kelchen, deren unterste Schuppen backenförmig gekrümmt sind, und lanzenförmigen in Querstücke getheilten Blättern. In dem mittägigen Europa.

Osmunda Lunaria minor. **Kleines Mondkraut.** 24 Klasse.

Mit gefiederten Blättern und eyförmigen gekörbten Blättchen. In Europa.

Osmunda regalis. **Königliche Osmunde.** 24 Klasse.

Mit doppelt gefiederten Blättern, welche an ihren Spitzen Blüthentrauben tragen. In Europa und Virginien.

Osmun-

Osmunda Spicant. **Gemeiner Spikant.** 24 Klasse.

Mit lanzenförmigen in Querstücke zertheilten Blättern, und zusammenfliessenden glatträndigen parallelen Blättchen. In Europa.

P.

Phalaris arundinacea. **Rohrartiges Glanzgras.** 3 Klasse.

Mit einer länglichten bauchigen weiten Rispe. In Europa.

Phlomis Leonurus. **Löwenschwanz.** 14 Klasse.

Mit lanzenförmigen sägeartig gezähnten Blättern; zehneckigen, zehnzähnigen unbewehrten Kelchen, und strauchartigem Stengel. Am Vorgebirge der guten Hofnung.

Polypodium fragile. **Zerbrechliches Engelsüß.** 24 Klasse.

Mit doppelt gefiederten Blättern und in einiger Entfernung stehenden Blättchen, deren Lappen rundlicht und eingeschnitten sind. In Europa.

Polytrichum commune. **Gemeines Goldhaar.** 24 Klasse.

Mit einem einfachen Stamme und einer vierkantigen Kapsel. In Europa.

Pteris caudata. **Geschwänzter Flügelfarrn.** 24 Klasse.

Mit dreyfach zusammengesetzten Blättern, gleichbreiten Blättchen, deren unterste an der Basis gefiedert-gezähnt, die auf der Spitze stehenden aber ungewöhnlich lang sind. Auf der Insel Jamaika und andern in Westindien.

S.

Scirpus cephalotes. **Indianische Semsen.** 3 Klasse.

Mit einem dreyseitigen nackten Halme, einem eyrunden sparrichten Blüthenkopfe und einer dreyblätterichten langen Hülle. In den beyden Indien.

Solanum Virginianum. **Virginischer Nachtschatten.** 5 Klasse.

Mit einem dornigen eckigen Stengel; in stumpfe Querstücke getheilten allenthalben dornigen Blättern und dornigen Kelchen. In Virginien und andern Theilen von Amerika.

Sphagnum palustre. **Sumpf-Torfmoos.** 24 Klasse.

Mit niedergebogenen Aesten. In Europa.

Z.

Zamia pumila. **Niedrige Keulpalme.** 24 Klasse.

Mit gefiederten Blättern, deren Blättchen fast gerade gegeneinander überstehen und lanzenförmig sind. Im südlichen Amerika.

Zea Mays. **Türkischer Weitzen.** 21 Klasse.

Mit Blättern, die am Rande ganz sind. In Amerika.

Zizania palustris. **Sumpfhafer.** 21 Klasse.

Mit einer unterwärts stehenden ästigen männlichen, und einer über derselbigen befindlichen weiblichen ährenförmigen Rispe. Im nördlichen Amerika.

Acrostichum septentrionale
Mitternächtlicher vollblühender Farren

Aira minuta
Kleine Schmiele.

Alopecurus agrestis.
Acker = Fuchsschwanz.

Anemone alpina.

Alpen Anemone.

Aretia alpina.
Aretische Alpenpflanze.

Asclepias incarnata.
Fleischrothe Hesculanie.

Asparagus officinalis.
Gewöhnlicher Spargel.

Asphodelus luteus.
Yelber Uffodil

Asplenium Ruta muraria.
Mauerraute

Asplenium Scolopendrium.
Hirschzunge.

Atropa belladonna.
Gemeine Wolfskirsche.

Avena flavescens.
Yoldhafer

Blitum capitatum.
Köpfige Beermelde.

Bromus mollis.
Weicher Tresp

Bryum hypnoides.

Ästmoosähnliches Knotenmoos.

Cactus repandus.
Ausgeschweifte Fackeldistel.

Cenchrus echinatus.
Jamaisches Stachelgras.

Cytisus Laburnum.
Bohnenbaum.

Dactylis glomerata.
Knäuelförmiges Hundsgras.

Dipsacus laciniatus.
Zerschlissene Karde.

Dracontium pertusum
Durchstossene Zehrwurz.



Drypis spinosa
Stachlichte Haberdistel.

Elymus Caput Medusae.
Medüsenhaupt.

Elymus sibiricus.

Sibirisches Roggengras.

Eryngium alpinum.
Alpen = Mannstreu.

Erythronium Dens Canis.
Gemeiner Hundszahn.

Euphorbia epithymioides.
Flachsseidenartige Euphorbie.

Euphorbia sylvatica
Waldeuphorbie.

Geranium hybridum.
Unächter Storchschnabl.

Gloriosa superba —.
Stolze Prachtlilie.

Hieracium sabaudum.
Savoyisches Habichtkraut.

Holcus lanatus.
Wolliges Honiggras.

Hordeum Zeocriton

Bartgerſte.

Isoetes lacustris.
See = Brachsenfarren

Lagurus ovatus
Eyförmiges Hāmtgras.

Lavatera trimestris.
Jyrische Lavatere.

Ligusticum austriacum.
Oesterreichischer Liebsstökel.

Lonicera Periclymenum.
Gemeine Specklilie.

Lonicera tatarica.
Tatariſche Lonicere.

Lycopodium inundatum.
Überschwemmte Bärlappe.

Milium paradoxum.
Haferartiges Hirsengras.

Mimosa punctata.
Jedüpfelte Mimpflanze.

Mnium fontanum.
Quellen = Sternmoos.

Mnium pellucidum
Durchsichtiges Sternmoos

Onopordum illyricum.
Illyrische Zellblume.

Osmunda Lunaria minor.
Kleines Mondkraut

Osmunda regalis.
Königliche Osmunde

Osmunda Spicant.
Schwedische Osmunda

Phalaris arundinacea

Rohrartiges Glanzgras.

Phlomis Leonurus.
Löwenschwanz

Polypodium fragile.
Zerbrechliches Engelsüß.

Polytrichum commune.
Gemeines Goldhaar.

Pteris caudata.
Geschwänzter Flügelfarrn.

Scirpus cephalotes.
Indianiſchẽ Semſen

Solanum virginianum.
Virginischer Nachtschatten.

Sphagnum palustre.
Sumpf: Torfmoos.

Zamia pumila.
Niedrige Keulpalme.

Zea Mays.

Turkischer Weitzen.

Zizania palustris.
Sumpfhafer.